

대청엽

大靑葉 *Isatidis Folium* [KHP]

송람(菘藍) *Isatis indigotica* Fort. (십자화과 Cruciferae)의 잎



감별 요점		중요도	비고
약용부위	잎		
전체모양	완전한 잎은 펼치면 긴 타원형~긴 원모양의 거꾸로 된 피침형이다.	★★	
질 감	취약하여 바스락거린다.		
크 기	잎의 길이 5~20 cm, 너비 2~6 cm	★★	
	잎자루의 길이 4~10 cm	★★	
바 깔 면	잎	윗표면은 비교적 진한 어두운 회록색이고 조금 돌기된 작은 점들이 관찰된다.	★
		끝부분은 밋밋하여 뾰족하지 않다.	★★
		가장자리는 매끈하며 거치가 없거나 약간 물결모양으로 기복이 있다.	★★
	아래부분(기부)은 좁고 아래로 잎자루까지 늘어져서 날개 모양을 이룬다.	★★	
	잎자루는 연한 황갈색이다.	★	
냄 새	약간 있다.		
맛	약간 시면서 쓰고 떫다.	★	
참 고	<ul style="list-style-type: none"> 고르고 완전한 모양이고 잎자루가 없으며 색이 회록색인 것이 좋다. 일반적으로 해마다 2~3회 채취한다. 6월 중순에 처음, 7~8월에 두 번째, 10~11월에 세 번째로 채취하는데, 날씨가 좋을 때 수확하여 잡질(雜質)을 제거하고 햇볕에 말린다. 뿌리는 판람근(板藍根)이다. 건조감량 : 18.0% 이하. 		



1) 대청엽



2) 대청엽(잎)



3) 쪽 잎 (윗면) (위품)



4) 쪽 잎 (아랫면) (위품)

- 1, 2) 대청엽 : 고르고 완전한 모양이고 잎자루가 없으며 색이 회록색인 것이 좋다.
 3, 4) 쪽 잎 : 마디풀과 식물인 쪽 *Persicaria tinctoria* H. Gross의 잎으로 요람(蓼藍)이라고 한다. 공장서의 기원과는 다르므로 위품이다. 완전한 잎은 타원형이고, 길이는 3~10cm이고, 너비는 2~5cm이다. 선단(先端)은 둔(鈍)하고 기부(基部)는 점차 좁아지며, 엽맥(葉脈)은 배면(背面)에서 비교적 돌출되어 있고 측맥(側脈) 또한 뚜렷하다.(위품)

